

1. 令 x_0, x_1, \dots, x_n 為在 $[a, b]$ 之間 $n+1$ 個相異點, y_0, y_1, \dots, y_n 為 $n+1$ 個實數。試證明存在唯一 n 次多項式 $P_n(x)$ 滿足 $P_n(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$. (10%)
2. 在一個 4 位有效位數的十進位計算系統中, $\frac{10}{3}$ 的浮點表示式是 $f\ell(\frac{10}{3}) = 0.3333 \times 10^1$.
 - (1) 何謂 unit of round-off? 這個計算系統的 unit of round-off 又是多少? (5%)
 - (2) 在這個計算系統中, $\frac{10}{3}$ 與 $f\ell(\frac{10}{3})$ 的絕對誤差是多少, 相對誤差又是多少? (5%)
 - (3) 以這個計算系統而言, 試舉例使得 $(x+y)+z \neq x+(y+z)$. (10%)
3. (1) 何謂 Newton's method? (10%)

 (2) 令函數 f 在 $[a, b]$ 之間為二階可微, 且 $f''(x)$ 有界, $x \in [a, b]$ 。假設 f 在 $[a, b]$ 之間有一根 x^* 且 $f'(x) \neq 0, \forall x \in [a, b]$ 。試証數列 $\{x_k\}$ 二階收斂到 x^* , 當初始值 x_0 足夠靠近 x^* , 其中數列 $\{x_k\}$ 由 Newton's method 所衍生。 (10%)
4. (1) 何謂 LU 分解? (5%)

 (2) 對方陣 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 試給一充分條件 使得矩陣 A 之 LU 分解存在。 (5%)

 (3) 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆且其 LU 分解存在。試証其 LU 分解必為唯一。 (5%) (註)(5%)

 (4) 何謂高斯消去法? (5%)

 (5) 請以高斯消去法求解線性系統 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \\ 13 \end{pmatrix}. \quad (10\%)$$
5. 令函數 f 在 x_0 可微。
 - (1) 請以中間差分法 (Central difference) 求數值微分 $f'(x_0)$. (5%)
 - (2) 試說明這個數值微分是不穩定的。 (5%)
 (提示: 考慮 $f(x+h) = \tilde{f}(x_0+h) + e(x_0+h)$, 其中
 $\tilde{f}(x_0+h) = f\ell(f(x_0+h))$,
 $e(x_0+h) = \text{the error term.}$)
6. 假設你的計算機中沒有內設的三角函數集, 請設計一個數值方法, 求圓週率 π . (10%)